DLP 29-3-85405181



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Rue Saint-Jean ● BP 19 ● 31131 BALMA Cedex
Tél. (61) 24.06.51

PUBLICATION PÉRIODIQUE
Abonnement annuel : *100F*
Sous-régisseur Recettes D.D.A. Hte-Gne
CCP : *8612-11 R Toulouse*

I.S.S.N. : 0752-2053

BULLETIN N° 4 DU 12 MARS 1985

COLZA

F.Z.

CHARANCON DE LA TIGE

Situation

Activité soutenue du ravageur, et **piégeage exceptionnellement important.**

Préconisations

Intervenir d'urgence dans les cultures encore non traitées.

Choisir un des produits de la liste figurant dans notre dernier bulletin.

La période de sensibilité prendra fin lorsque les cultures auront atteint le stade "Tige à 20 cm".

MELIGETHES

Situation

Premières captures en cuvettes jaunes au début du mois.

Préconisation

Toute intervention est encore prématurée.

CEREALES

DESHERBAGE DE PRINTEMPS

Les céréales sont actuellement au **stade plein tallage** dans la majorité des situations. C'est l'époque la plus favorable pour effectuer le désherbage de fin d'hiver.

L'observation des mauvaises herbes dans les parcelles doit décider du choix du désherbant à utiliser.

La note jointe est destinée à vous guider dans ce choix.

CAS PARTICULIER DU BLE DUR

Cette culture est particulièrement sensible à l'action des herbicides.

Pour éviter tout problème de phytotoxicité :

→ **Proscrire** toute spécialité commerciale contenant de l'**isoproturon.**

→ **Moduler** les doses et **respecter** scrupuleusement les conditions d'emploi des produits. Seule l'utilisation des antigraminées spécifiques (ILLOXAN CE et SUFFIX 425) ne présente pas de restrictions particulières.

*
* *
*

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de MIDI-PYRÉNÉES Le Directeur-Gérant : J. TOUZEAU CPPAP N° 532 AD

P6

DÉSHERBAGE DE PRINTEMPS DES BLÉS ET ORGES D'HIVER

VOUS VOULEZ DÉTRUIRE DES GRAMINÉES

Votre céréale est au stade / Adventices	Folle avoine – Tallée	Folle avoine – Non tallée	Vulpin	Autres
3 feuilles – Début tallage		Dicuran Chlortolure Dosanex Tribunil* *isoproturon*	Dicuran Chlortolure Dosanex Tribunil* *isoproturon*	Dicuran Chlortolure Dosanex Tribunil* Carésine 2 *isoproturon*
Début tallage – Mi tallage	Illoxan CE	Dicuran Chlortolure Dosanex Tribunil* *isoproturon*	Dicuran Chlortolure Dosanex Tribunil* *isoproturon*	Dicuran Chlortolure Dosanex Tribunil* Carésine 2 *isoproturon*
Mi tallage – Fin tallage	Illoxan CE	Dosanex *isoproturon*	Dosanex *isoproturon*	Dosanex *isoproturon*
Épi 1 cm – 2ème Noeud	Suffix 425		Suffix 425	

* Blé seulement

VOUS VOULEZ DÉTRUIRE DES GRAMINÉES ET DES DICOTYLÉDONES

Votre céréale est au stade / Adventices	Dicotylédones non germées ou plantules. Graminées non tallées	Dicotylédones plantules. Graminées non tallées	Dicotylédones plantules, plantes jeunes et plantes développées. Graminées non tallées
3 feuilles – Mi tallage	Dicuran Chlortolure EL Dosanex *isoproturon*	Carésine 2 Tolkan S Fagal Belgran Printan K Foxtar	Fagal Belgran Printan K Foxtar
Mi tallage – Fin tallage	Dosanex *isoproturon*	Carésine 2 Tolkan S Fagal Belgran Printan K Foxtar	Fagal Belgran Printan K Foxtar


VOUS VOULEZ DÉTRUIRE DES DICOTYLÉDONES

Votre céréale est au stade / Adventices	Plantules seules	Plantules et plantes jeunes	Plantules, plantes jeunes et plantes développées
3 feuilles – Début tallage	*DNOC* *Dinosèbe* *Dinoterbe*	Certrol (H et Plus) Oxytril M Actril M	
Début tallage – Fin tallage	*DNOC* *Dinosèbe* *Dinoterbe* Jarex Kiporon Bladotyl Herbeko Plus	Certrol (H et Plus) Oxytril M Actril M Foxpro Bifox Trifox DM 68	Skill-Ceral Cydexone Cepedic Pesconex Trinol Diptyl Printazol Linoxone Herbaron Koril Saturyl Aurigal Basagran Brominal Seppic MMD Allie Oxolon Saturnal Zargon Lonpar MCPA
Fin tallage – Épi 1 cm	*Dinoterbe* Kiporon Bladotyl Herbeko Plus	*MCPP* *MCPB*	Linoxone Saturyl Herbaron Koril Aurigal Saturnal Seppic MMD Brominal Basagran Zargon Lonpar Oxolon
Épi 1 cm – 2ème noeud		Actril DM 68 Bifox Trifox Tropotone	*MCPA* *2.4.D* *2.4.D + MCPP ou MCPB* *2.4.D + 2.4.DP* *2.4.D + MCPA + MCPP*

Plantules : jusqu'à 2-3 feuilles vraies. **Plantes jeunes** : jusqu'à 6-8 feuilles.
Les noms en italique indiquent des matières actives correspondant à de nombreuses spécialités commerciales.

[grisé] traitement possible à ce stade — [blanc] aucune utilisation de produit possible à ce stade de la céréale.

SPÉCIALITÉS ANTIGRAMINÉES ET MIXTES



Spécialités	Matières actives	Dicotylédones sensibles — Matricaires	Gaillet	Pensée	Véroniques	Renouées	Mourons	Observations
Belgran	*Isoproturon + MCPP + Ioxynil*							T° mini pour traiter 5 - 6°
Carésine 2	*Isoproturon + Bentazone + 2.4.DP*							Traiter par des T° supérieures à 10°
Chlortolure EL, Dicuran	*Chlortoluron*							Attention variétés de blé sensibles (*)
Dosanex FL	*Metoxuron*							Attention variétés de blé sensibles (*)
Fagal	*Isoproturon + MCPP + Ioxynil*							T° mini pour traiter 5 - 10°
Foxtar	*Isoproturon + Bifénox + MCPP*							T° mini pour traiter 5 - 10°
Illoxan CE	*Dichlofop méthyl*	*antigraminées spécifique*						Traiter par «temps poussant»
Nombreuses spécialités	*Isoproturon*							Dose maxi pour la folle avoine (1800 à 2000 g) Autres adventices (1200 à 1500 g)
Printan K	*Isoproturon + MCPP*							T° mini pour traiter 5 - 10°
Suffix 425	*L Flampropisopropyl*	*antigraminées spécifique*						Traiter par «temps poussant»
Tolkan S	*Isoproturon + Dinoterbe*							T° mini pour traiter 5 - 10°
Tribunil	*Méthabenzthiazuron*							

(*) Abo, Alto, Arminda, Aquila, Aviso, Carat, Cargo, Corin, Heima, Hobbit, Kinsman, Magister, Maris Huntsman, Nautica, Pernel, Riol, Rotonde, Sabre, Scipion, Vasco, Valmy
(**) Seulement sur mouron blanc

SPÉCIALITÉS ANTIDICOTYLÉDONES

Spécialités	Matières actives	Dicotylédones sensibles — Matricaires	Gaillet	Pensée	Véroniques	Renouées	Mourons	T° d'utilisation * **
Actril M	*MCPP (sels) + Ioxynil*							10 25
Allie	*Metsulfuron méthyl*							
Aurigal	*3.6.DCP + Ioxynil + MCPA + MCPP*							8 20
Basagran DP	*Bentazone + 2.4.DP*							12 25
Bifox	*Bifenox + MCPP*							10 25
Bladotyl	*Cyanazine + MCPP*							10 25
Brominal	*Bromoxynil + MCPA + MCPP*							8 25
Certrol H	*Ioxynil + MCPP (esters)*							8 20
Nombreuses spécialités	*Dicamba + MCPP*							10 25
Desormone TC	*2.4.DP + 2.4.D*							10 25
Diptyl	*Dicamba + MCPA + MCPP*							10 25
D M 68	*Dinoterbe + MCPP*							8 25
Nombreuses spécialités	*Dinosèbe*							8 25
Nombreuses spécialités	*Dinoterbe*							5 25
Nombreuses spécialités	*DNOC*							0 25
Foxpro	*Bifenox + Ioxynil + MCPP*							10 25
Herbaron	*Dicamba + Bromoxynil + MCPP*							8 20
Jarex	*Cyanazine + Ioxynil*							8 25
Kiporon	*Cyanazine + 2.4.DP*							10 25
Koril	*Dicamba + Bromoxynil + MCPP*							8 20
Linoxone extra	*MCPA + MCPP*							10 25
Lonpar	*3.6.DPC + 2.4.D + MCPA*							10 25
Nombreuses spécialités	*MCPA*							10 25
Nombreuses spécialités	*MCPP*							10 25
Oxolon	*Bromoxynil + 3.6.DCP + MCPP*							10 25
Oxytril M	*Ioxynil + Bromoxynil + MCPP*							8 20
Pesconex	*TBA + MCPA + MCPP*							10 25
Printazol N	*Piclorame + 2.4.D + MCPA*							10 25
Printazol total	*Piclorame + 2.4.D + MCPA + MCPP*							10 25
Saturil	*Bromoxynil + 3.6.DCP + MCPA + MCPP*							10 25
Saturnal	*3.6.DCP + MCPP*							10 25
Seppic MMD	*3.6.DCP + MCPA + MCPP*							10 25
Skill, Ceral	*Dicamba + DNOC + MCPP*							10 25
Trifox	*Bifenox + 3.6.DCP + MCPP*							10 25
Trinol	*Dicamba + MCPA + MCPP*							10 25
Tropotone	*MCPB*							8 25
Zargon	*3.6.DCP + MCPP*							10 25
Nombreuses spécialités	*2.4.D sels*							10 25
Nombreuses spécialités	*2.4.D esters*							8 20
Nombreuses spécialités	*2.4.D + MCPP*							10 25
Nombreuses spécialités	*2.4.DP + MCPA + MCPP*							10 25

* Plages optimales d'utilisation pour valoriser les différentes matières actives
** Eviter de traiter si les risques de pluie sont importants (sauf pour Dicuran, Chlortolure, Dosanex, Tribunil, Allie)

Légende : bonne efficacité — efficacité moyenne à bonne — efficacité irrégulière ou insuffisante — inefficace — pas de données